

核准日期: 2007.04.23
修改日期: 2010.10.01
修改日期: 2015.12.01
修改日期: 2020.12.01

葡萄糖酸锑钠注射液说明书
请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】

通用名称: 葡萄糖酸锑钠注射液

英文名称: Sodium Stibogluconate Injection

汉语拼音: Putaotangsuantina Zhushye

【成 份】 化学名称: 葡萄糖酸锑钠

【性 状】 本品为无色至淡黄色的澄明液体

【适 应 症】 用于治疗黑热病。

【规 格】 6ml(按 Sb 计 0.6g, 约相当于葡萄糖酸锑钠 1.9g)。

【用法用量】

肌内或静脉注射, 一般成人一次 6ml(1 支, 含五价锑 0.6g), 一日 1 次, 连用 6 ~ 10 日; 或总剂量按体重 90 ~ 130mg/kg (以 50kg 为限), 等分 6 ~ 10 次, 每日 1 次。小儿总剂量按体重 150 ~ 200mg/Kg, 分为 6 次, 每日 1 次。对敏感性较差的虫株感染, 可重复 1 ~ 2 个疗程, 间隔 10 ~ 14 日。对全身情况较差者, 可每周注射 2 次, 疗程 3 周或更长。对新近曾接受锑剂治疗者, 可减少剂量。

【不良反应】

与三价锑相仿, 但较少而轻, 一般病人多能耐受。有时出现恶心、呕吐、咳嗽、腹痛、腹泻现象, 偶见白细胞减少。特殊反应包括肌注局部痛、肌痛和关节僵直。后期出现心电图改变(如 T 波低平或倒置、QT 时间延长等), 为可逆性, 但可能为严重心律失常的前奏。肝、肾功能异常者应加强监测。罕见休克和突然死亡。

【禁 忌】 肺炎、肺结核及严重心、肝、肾疾患者禁用。

【注意事项】

(1) 肝功能不全者慎用。

(2) 治疗过程中有出血倾向, 体温突然上升或粒细胞减少、呼吸加速、剧烈咳嗽、浮肿、腹水时, 应暂停注射。

(3) 过期药物有变成三价锑的可能, 不宜使用。

【孕妇及哺乳期妇女用药】 尚不明确。

【儿童用药】 未进行该项实验且无可靠参考文献。

【老年用药】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药物相互作用】尚不明确。

【药物过量】未进行该项实验且无可靠参考文献。

【药理毒理】

本品为五价锑化合物。对组织中培养生长的前鞭毛体(promastigote)无作用，但对体内寄生者[无前鞭毛体(promastigote)]则有良效，提示五价锑必须还原成三价锑才能发挥作用。其作用机制不详，已知锑可通过与巯基结合而起作用。药物通过选择性细胞内胞饮摄入，进入巨噬细胞的吞噬体，其中存在的利什曼原虫即被消灭。

【药代动力学】

本品口服吸收差。肌注吸收良好，不与红细胞结合，其血浆浓度则远较三价锑化合物为高，但维持时间较短，较快由肾脏排出，80%的药物于6小时内由尿中排出，静脉注射相同量药物后95%以上由尿中排出，表明该药物在体内无明显代谢，无明显蓄积现象。但如肾功能受损，则可妨碍锑的排泄，可致中毒。小量在肝内还原成三价锑。约12%蓄积于血管外腔隙，在该处给药5日后即呈饱和状态，由此锑剂缓慢释放。

【贮藏】遮光，密闭保存。

【包装】5ml安瓿，6支/盒。

【有效期】36个月。

【执行标准】中国药典2020年版二部。

【批准文号】国药准字H37020742。

【生产企业】

企业名称：山东新华制药股份有限公司

生产地址：山东省淄博市高新区鲁泰大道1号

邮政编码：255086

电话号码：0533-2196361

传真号码：0533-2196365

网 址：www.xhzy.com

【药品上市许可持有人】

企业名称：山东新华制药股份有限公司

注册地址：淄博市高新技术产业开发区化工区

邮政编码：255000

电话号码：0533-2166666

传真号码：0533-2184991

网 址：www.xhzy.com

